

花生红衣

Huashenghongyi

ARACHIS TESTA

本品为豆科植物落花生 *Arachis hypogaea* L. 成熟种子的种皮。秋季刨出花生,除去泥土及外部黄白色果皮,烘干,轻搓取种皮。

【性状】 本品呈碎片状,大小不一。外表面红色,有纵脉纹,内表面黄白色,脉纹明显。质轻易碎。气微,味涩、微苦。

【鉴别】 (1)本品粉末淡红色。种皮细胞顶面观呈多角形,壁有条纹状增厚,条纹有的长达细胞中心,有的内含棕色物;种皮细胞侧面观呈长方形,其外缘被有角质层。薄壁细胞淡黄色,壁呈波浪状,含淡黄色物。环纹导管或螺纹导管。

(2)取本品粉末 2g,加水 50ml,煮沸 15 分钟,滤过,滤液用盐酸调节 pH 值至 2~3,用乙醚振摇提取 3 次,每次 10ml,合并乙醚液,挥干,残渣加甲醇 1ml 使溶解,作为供试品溶液。另取花生红衣对照药材 2g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2020 年版通则 0502)试验,吸取上述两种溶液各 10 μ l,分别点于同一硅胶 G 薄层板上,以甲苯-乙酸乙酯-甲酸(15:10:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以 1%间苯三酚乙醇溶液-硫酸(1:1)的混合溶液(临用时配制),在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰,分别置日光和紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点和荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 15.0%(《中国药典》2020 年版通则 0832 第二法)

总灰分 不得过 6.0%(《中国药典》2020 年版通则 2302)

【浸出物】 取本品粉末 5g,精密称定,加水 100ml,置 60 $^{\circ}$ C 水浴中浸提 2 次,每次 3 小时,滤过,合并滤液,置 250ml 量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,精密量取 50ml,置已干燥至恒重的蒸发皿中,蒸干,于 105 $^{\circ}$ C 干燥 3 小时,置干燥器中冷却 30 分钟,迅速精密称定重量。

本品按干燥品计算,不得少于 12.0%。

【性味与归经】 甘、微苦、涩,温。归心、肝经。

【功能与主治】 补血养血,益气健脾,滋补肝肾。用于各类贫血,血小板减少性紫癜,血友病,接触核能或从事放射性工作者;以及化疗、放疗后的血液异常等病症。

【用法与用量】 5~30g。

【贮藏】 置干燥处。

济南三源药业有限公司

检验报告单

报告编号: BG/CP/HSKY/25001

产品名称	花生红衣	规格	净制	装量	5g/袋×50袋/中袋
批号	250801		检品数量	50袋	
药材产地	山东临沂		检验目的	成品检验	
生产日期	2025年08月15日		报告日期	2025年08月25日	
检验依据	《山东省中药材标准》2022年版				
检验项目	标准规定		检验结果		

【性状】应呈碎片状，大小不一。外表面红色，有纵脉纹，内表面黄白色，脉纹明显，质轻易碎，气微，味涩，微苦。本品呈碎片状，大小不一。外表面红色，有纵脉纹，内表面黄白色，脉纹明显，质轻易碎，气微，味涩，微苦。

【鉴别】显微鉴别应特征明显显微鉴别特征明显
薄层鉴别应符合规定薄层鉴别符合规定

【检查】

水分不得过 15.0%11.0%
总灰分不得过 6.0%2.6%
杂质不得过 3.0%0.13%
二氧化硫残留量不得过 150mg/kg6.42mg/kg

【浸出物】不得少于 12.0%14.2%

【包装检查】应符合规定符合规定

结论: 本品按《山东省中药材标准》2022 年版检验，结果符合规定。

检验人: 牛晓悦

复核人: 何晓雨

负责人:

王全

三源 中药饮片

花生红衣

5g/袋



【产品属性】 中药饮片
【品名】 花生红衣
【装量】 5g/袋
【药材产地】 山东临沂
【执行标准】 《山东省中药材标准》2022年版
【贮藏】 置干燥处。
【生产企业】 济南三源药业有限公司
【地址】 山东省济南市章丘区明水经济开发区工业一路西北段
【药品生产许可证号】 鲁20160031
【电话】 0531-61320036

【产品批号】 250801
【生产日期】 2025/08/15
【保质期至】 2028/08/14 等级：精选



合格证

【产品属性】 中药饮片
【品名】 花生红衣
【规格】 净制 等级：精选
【装量】 5g/袋*50袋/中袋
【药材产地】 山东临沂
【执行标准】 《山东省中药材标准》2022年版
【贮藏】 置干燥处。
【产品批号】 250801
【生产日期】 2025/08/15
【保质期至】 2028/08/14
【检验员】 01

药品追溯码



济南三源药业有限公司

